



ODDELEK ZA OKULISTIKO

OBVEŠČENI PRISTANEK BOLNIKA ZA INTRAVITREALNO ZDRAVLJENJE Z anti-VEGF ZDRAVILI

(Navodilo pacientom)

_____ ime in priimek bolnika

nalepka

Seznanjen-a sem z zdravljenjem makularnega edema z injekcijami **zaviralcev rastnega dejavnika za endotelij žil (anti-VEGF)** v oko.

Injekcije bom sprva prejemal-a enkrat mesečno, kasneje v podaljšanih razmikih glede na učinek zdravljenja.

Prebral-a sem, oz. mi je bilo prebrano **Pojasnilo bolniku o zdravljenju z anti-VEGF zdravili**.

Seznanjen-a sem s tveganjem tega zdravljenja.

Na moja vprašanja sem dobil-a razumljive in popolne odgovore in se strinjam z zdravljenjem z injekcijami anti-VEGF v oko.

Potrdujem, da sem se lahko po prejetju "*Pojasnil bolniku o zdravljenju z anti-VEGF zdravili*" z vprašanji obrnil-a na zdravnika in da sem imel-a dovolj časa, da sem se po predhodni seznanitvi in temeljitem premisleku prostovoljno odločil-a za zdravljenje.

Šempeter pri Gorici, _____ datum

_____ podpis bolnika

_____ podpis zdravnika

Strinjam se, da se moji podatki v anonimni obliki lahko dalje obdelujejo, uporabijo in objavijo za strokovne namene. Pojasnjeno mi je bilo, da lahko privolitev v objavo mojih podatkov kasneje tudi prekličem in da to ne bo vplivalo na moje zdravljenje.

_____ podpis bolnika

Kontaktna telefonska številka: _____



SPLOŠNO ZDRAVSTVENO STANJE

SRČNO-ŽILNE BOLEZNI

Ali ste preboleli možgansko kap? DA NE

Kdaj? _____

Ali ste preboleli srčni infarkt? DA NE

Kdaj? _____

Ali ste bili operirani na srcu? DA NE

Kaj in kdaj? _____

Ali imate motnje srčnega ritma? DA NE

Ali ste se zdravili zaradi motenj srčnega ritma? DA NE

Ali imate angino pektoris? DA NE

Ali se zdravite zaradi povišanega krvnega pritiska? DA NE

Ali imate povišane krvne maščobe? DA NE

Ali kadite? DA NE

Koliko cigaret na dan? _____

Ali ste noseči? DA NE

ZDRAVILA KI JIH TRENUTNO JEMLJETE:

POJASNILO BOLNIKU O ZDRAVLJENJU Z anti-VEGF ZDRAVILI

OPIS in NAMEN

S tem pojasnilom vas želimo seznaniti z zdravljenjem oteklina rumene pege oziroma edema v makuli ali novostvorjenih žil z **injekcijami zdravil zaviralcev VEGF v oko** v naši bolnišnici.

Spremembe vida, ki ste jih opazili, so posledica sprememb na zadajšnjem delu očesa. Spremembe so nastale v delu mrežnice, ki je potreben za vid v sredini vidnega polja. Ta del mrežnice imenujemo rumena pega ali makula. Izguba centralnega vida je posledica oteklina v makuli. Oteklina je lahko posledica večje propustnosti obstoječih žil (pri diabetični retinopatiji, pri zapori vene, pri vnetju) ali pa razraščanja novih žil (choroidal neovascularization, CNV) na zadajšnjem delu očesa. Nove žile lahko počijo in iz njih se izlije kri, mrežnica nad temi spremembami se s časom zabrazgotini in čutne celice za vid propadejo. Večina nezdravljenih bolnikov za vselej izgubi centralni vid.

ZDRAVILA anti-VEGF

Anti-VEGF so biološka zdravila, ki zavirajo proces tvorbe novih žilic in zmanjšajo propustnost žil. Delujejo na VEGF (vascular endothelial growth factor), to je dejavnik, ki spodbuja rast novih žil. Ko zaviralce VEGF injiciramo v oko, se vežejo na receptorje za VEGF in ga s tem blokirajo. Raziskave kažejo, da pri določenih vrstah edema v makuli v povprečju ohranjajo ali celo izboljšajo vidno ostrino, do izboljšanja vida pa ne pride pri vseh bolnikih.

Zdravilo je potrebno vbrizgati v oko sprva enkrat na mesec, več zaporednih mesecev. Po stabilizaciji klinične slike se razmik med injekcijami podaljšuje, ob ponovnem slabšanju pa skrajšuje.

MOŽNI STRANSKI POJAVI ZDRAVLJENJA

Možni so **stranski pojavi zaradi injekcije v oko**: krvavitev v veznico, povišan očesni pritisk in plavajoče motnjave v očesu.

Hujši stranski pojavi so: okužba notranjosti očesa (endofthalmitis), odstop mrežnice, krvavitev v oko, zamotnitev leče (katarakta), vnetje (uveitis, vitritis), vaskulitis, okluzivni vaskulitis.

Hujši zapleti se pojavijo v manj kot 0,1% zdravljenj (manj kot 1 zaplet na 1000 zdravljenj).

POTEK APLIKACIJE ZDRAVILA V OKO

Injekcijo zaviralcev VEGF vam bodo aplicirali v Čistem prostoru za intravitrealno terapijo (clean room). Na oko vam bodo najprej kapnili kapljico anestetika, da med injekcijo ne boste čutili bolečine in kapljico antibakterijskega sredstva. Pripravili bomo sterilno operacijsko polje: okolico očesa bomo očistili, glavo prekrili s sterilno kompresom, vstavili vam bomo držalo za veke, ponovno bomo kapnili kapljici za anesteziiranje in razkuževanje površine očesa. Zdravnik vam bo v predvideno oko vbrizgal zdravilo.

NAVODILA PO POSEGU

Zaradi široke zenice bo po pregledu in posegu nekaj ur megljen vid. Zdravljeno oko bo praviloma 1 uro pokrito z očesnim tamponom. Približno 6 ur po pregledu ne smete upravljati vozil. Svetujemo, da si uredite spremstvo, oziroma prevoz.